



CUT OFF

FICHA TÉCNICA



Numero de Registro Sanitario:
RSCO-MEZC-FUNG-0911E-X0087-009-8.0



CUT OFF



GENERALIDADES:

CUT-OFF es un fungicida -bactericida de amplio espectro, formulado a base de aceites especiales y extractos de origen naturales incorporados mediante un proceso de hidrólisis que proporcionan una protección al cultivo contra hongos y bacterias perjudiciales sin provocar estrés ni intoxicación.

INSTRUCCIONES DE USO DEL PRODUCTO:

Primero, antes de usar **CUT-OFF** calibre el equipo de aplicación, se recomienda utilizar un alto volumen de agua para una buena cobertura y de preferencia usar un coadyuvante de última generación para una buena dispersión y cobertura, para un mejor efecto del producto evita hacer aplicaciones a altas temperaturas o días con lluvia, evitar aplicar en sentido contrario a la dirección del viento.

Composición Pocental.

% en peso

Aceites esenciales de Arbol Del Té (Eq. a 51.12 g.i.a./L)	5.00 %
Aceite esencial de Cedro (Eq. a 20.45 g.i.a./L)	2.00 %
Aceite esencial de Eucalipto (Eq. a 10.22 g.i.a./L)	1.00 %
Diluyentes y Acondicionadores (Eq. a 10.22 g.i.a./L)	92.00 %
Total	100.00 %

CUT OFF

INCOMPATIBILIDAD:

CUT-OFF es compatible con fertilizantes, fungicidas e insecticidas de uso común. Es compatible con soluciones acidas. No se mezcle con azufre ni cobre, se recomienda hacer pruebas previas cuando se desconozca la compatibilidad entre los productos a mezclar.

FITOTOXICIDAD:

Se puede aplicar a cualquier tipo de cultivo sin causar fitotoxicidad alguna siempre y cuando se utilice en las dosis recomendadas.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Almacene a temperatura ambiente en lugar ventilado y sombreado manténgase en su embase original bien cerrado y etiquetado, no existe restricciones de almacenamiento y transporte del producto.

Tabla de cultivos.

CULTIVO	% en peso	DOSIS DE RIEGO
Jitomate Chile Chile bell Berenjena Papa	Cenicilla (<i>Levilulla taurica</i>) Cenicilla (<i>Oidopsis taurica</i>) Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>) Tizon tardio (<i>Phytophthora infestans</i>)	Dosis mínima recomendada, 4 ml. Por 1 litro de agua Dosis máxima recomendada, 10 ml. Por 1 litro de agua.
Pepino Calabaza Melón Sandía Crucíferas	Cenicilla (<i>Erysifhe chichoracearum</i>) Mildew (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>) Tizón temprano (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>) Mancha foliar bacteriana (<i>Pseudomonas syriacae pv lacrimans</i>)	Dosis mínima recomendada, 3 ml. Por 1 litro de agua Dosis máxima recomendada, 10 ml. Por 1 litro de agua.
Frutales Plátanos	Mildew (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>) Antracnosis (<i>Colletotrichum sp.</i>)	Dosis mínima recomendada, 3 ml. Por 1 litro de agua Dosis máxima recomendada, 10 ml. Por 1 litro de agua.
Fresas Arandanos Frambuesas	Cenicilla (<i>Erysifhe chichoracearum</i>) Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	Dosis mínima recomendada, 3 ml. Por 1 litro de agua Dosis máxima recomendada, 10 ml. Por 1 litro de agua.